

# BCG ክትባት

ለወላጆች እንክብካቤ ከተደረገ በኋላ

የ BCG ክትባት ጣቢያ እንዴት መያዝ ያለበት



**immunise**


their best protection

# ልጅዎ የBCG ክትባት ክትባት ከወሰደ/ች በኋላ ምን መጠበቅ አለብዎ

ከ1-6 ሳምንታት ውስጥ፣ ክትባቱ በተሰጠበት ሰፍራ ላይ ትንሽ ቀይ ውሃ የቋጠረ የሰውነት አካል ሊኖር ይችላል። ይህ በጥቂት ሳምንታት ውስጥ ይድናል።

ከ6-12 ሳምንታት ውስጥ፣ ውሃ የቋጠረ የሰውነት አካል ወደ ትንሽ የሚያዥኩ እብጠት ይለወጣል። ይህ ከሆነ፣ የሰውነት አካሉን በጉዝ ይሸፍኑት እና አየር እንዲገባ ያድርጉ። የሚያጣብቁ ፕላስቲኮችን አይጠቀሙ።

እብጠቱ ለመዳን እስከ 3 ወራት ድረስ ሊወሰድ ይችላል እና ትንሽ ጠባሳንም ጥሎ ያልፍ ይሆናል። ይህ የተለመደ ነው።



## ክትባት የተሰጠበትን የሰውነት አካል እንዴት ነው መንከባከብ የሚገባው

- ክትባት የተሰጠበትን የሰውነት አካል ንጹህ እና ደረቅ እንደሆነ ማረጋገጥ
- እብጠት ካጋጠመ፣ የሰውነት አካሉን በጉዝ በመሸፈን አየር እንዲገባ ማድረግ።



የሰውነት አካሉን ጭምቅ አድርገው አይያዙት ወይም አይከኩት።



በሰውነት አካሉ ላይ የሚያጣብቅ ፕላስቲክን አይለጥፉ።



የሰውነት አካሉን ቅባቶች፣ ዘይቶች፣ ወይም ስራሰሮችን አይቀቡ።



የሰውነት አካሉን አይከኩ ወይም አይሹ።

ስለ TB ወይም BCG ክትባት ማንኛውም ጥያቄ ካለዎ ወይም መረጃ ከፈለጉ፣ እባክዎን የጤና ባለሞያ ነርስዎን ያነጋግሩ።

የጤና ባለሞያ ነርስ ስም፦ \_\_\_\_\_

ስልክ፦ \_\_\_\_\_

ከስራ ሰዓት ውጭ ለሚኖርዎ ለማንኛውም ጥያቄዎች እና ፍላጎቶች እባክዎን በጤና መስመር በስልክ ቁጥር 0800 611 116 ይደውሉ።



New Zealand Government



their best protection