

बीसीजी टीका

माता-पिता द्वारा ध्यान रखी जाने वाली बातें

जिस जगह पर बीसीजी का टीका दिया गया है उसका ध्यान कैसे रखें



immunise


their best protection

आपके बच्चे को बीसीजी का टीका लगने के बाद क्या हो सकता है

1 से 6 हफ्तों में, जहां इंजेक्शन दिया गया है वहां पर छोटा-सा लाल फफोला दिखाई दे सकता है। यह कुछ ही हफ्तों में ठीक हो जाना चाहिए।

6 से 12 हफ्ते के बाद, यह फफोला छोटे से घाव का रूप ले सकता है। यदि ऐसा होता है, तो उस स्थान को पट्टी से ढंक दें ताकि वहां हवा पहुंचती रहे। चिपकने वाले प्लास्टर्स का उपयोग न करें।

घाव के ठीक होने में तीन महीने तक का समय लग सकता है और वहां छोटा निशान पड़ा रह सकता है। यह सामान्य बात है।



बीसीजी वैक्सिनेशन साइट



वैक्सिनेशन साइट की देखभाल कैसे करें

- साइट को साफ और सूखा रखें
- अगर घाव बढ़ने लगे तो तो साइट को गॉज से कवर कर दें जिससे हवा उसके अंदर जा सके।



साइट को नोचें या खरोंच नहीं।



साइट पर चिपकने वाले प्लास्टर्स का इस्तेमाल न करें।



साइट पर मरहम, तेल, या हर्ब्स का प्रयोग न करें।



साइट को न रगड़ें न ही उस पर मसाज करें।

अगर आपको टीबी या बीसीजी वैक्सिन से कोई समस्या है या इसके बारे में जानकारी की जरूरत है, तो कृपया अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स से संपर्क करें।

सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स का नाम: _____

टेलीफोन: _____

किसी भी प्रश्न या परेशानी के लिए कृपया 0800 611 116 पर हमारे हेल्थलाइन पर कॉल करें।