

Vắc xin BCG là gì?

Vắc xin BCG được dành để tiêm phòng cho các em bé có nguy cơ mắc bệnh lao cao.

Vắc xin BCG giúp cho hệ thống miễn dịch của em bé nhà bạn chống chọi được với những vi trùng gây ra bệnh lao và giúp cho em bé nhà bạn không bị mắc bệnh lao ở mức độ nghiêm trọng.

Vắc xin BCG được tiêm phòng miễn phí cho các em bé dưới năm tuổi có nguy cơ mắc bệnh lao cao.

Nếu bạn có câu hỏi gì, hay muốn tìm hiểu thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Tên của dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng:

Địa chỉ: _____

Điện thoại: _____

Trang web: _____

Để biết thêm thông tin

www.health.govt.nz/tuberculosis



New Zealand Government

Tài liệu này có sẵn trên trang web www.health.govt.nz hay tại Nhà Cung cấp có Ủy quyền ở Ban Y tế Địa phương. Revised February 2015. Vietnamese.
Code **HE2215**

Vắc xin BCG

Thông tin dành cho các bậc cha mẹ

Dành cho các trẻ sơ sinh và trẻ em có nguy cơ mắc bệnh lao (TB)



immunise

their best protection

immunise

their best protection



Những em bé nào nên được tiêm vắc xin BCG?

Vắc xin Bacille Calmette-Guérin (BCG) được dành để tiêm phòng cho các em bé dưới năm tuổi có nguy cơ mắc bệnh lao cao.

Em bé của bạn có nguy cơ mắc bệnh lao cao và đạt đủ điều kiện để tiêm phòng vắc xin BCG miễn phí nếu em bé:

- Sẽ sống cùng nhà với một người đang mắc bệnh lao hoặc có tiền sử mắc bệnh lao
- Có bố mẹ hoặc các thành viên trong gia đình hoặc người chăm sóc đã từng (trong vòng năm năm trở lại đây) sống sáu tháng hoặc lâu hơn ở các nước có tỷ lệ mắc bệnh lao cao
- Sẽ sống ba tháng hoặc lâu hơn (trong vòng năm năm đầu đời) ở một nước có tỷ lệ mắc bệnh lao cao và sẽ có thể tiếp xúc với những người mắc bệnh lao.

Bà đỡ hay bác sĩ của bạn sẽ cho bạn biết nếu em bé của bạn có nguy cơ mắc bệnh lao cao. Nhìn chung, những khu vực dưới đây có tỷ lệ mắc bệnh lao cao:

- Hầu hết các khu vực thuộc châu Phi
- Nhiều khu vực thuộc Nam Mỹ
- Nga và các nước thuộc Liên bang Xô-viết cũ
- Tiểu lục địa Ấn Độ
- Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông và Đài Loan (Trung Hoa Dân Quốc)
- Đông Nam Á (ngoại trừ Singapore)
- Một số quốc gia thuộc Thái Bình Dương (ngoại trừ quần đảo Cook, Niue, Samoa, Tokelau và Tonga).

Bệnh lao (TB) là gì?

- Bệnh lao là một loại bệnh truyền nhiễm. Bệnh này có thể gây ra mệt mỏi, ho, sốt và khó thở.
- Bệnh lao thường ảnh hưởng tới phổi, nhưng cũng có thể ảnh hưởng tới các bộ phận khác trong cơ thể, như là các hạch bạch huyết, xương, khớp và thận. Bệnh lao ở mức độ nghiêm trọng có thể gây ra bệnh viêm màng não.
- Bệnh lao có thể lây từ người này sang người khác qua việc ho, khạc hay hắt hơi vào trong không khí.
- Hàng năm có khoảng 300 trường hợp mắc bệnh lao ở New Zealand.

Làm sao tôi có thể phòng tránh cho em bé nhà mình khỏi mắc bệnh lao?

Bạn có thể đưa em bé nhà mình đi tiêm vắc xin BCG. Vắc xin này giúp cho hệ thống miễn dịch của em bé nhà bạn chống chọi được với những vi trùng gây ra bệnh lao và giúp cho em bé nhà bạn không bị mắc bệnh lao ở mức độ nghiêm trọng.

Em bé nhà bạn sẽ được tiêm vắc xin ở cánh tay trên.

Tôi nên đưa em bé nhà mình đi tiêm vắc xin BCG vào thời điểm nào là thích hợp nhất?

- Thời điểm thích hợp nhất để đưa em bé nhà bạn đi tiêm vắc xin BCG là thời điểm em bé được vài ngày sau sinh cho đến lúc em bé được sáu tháng tuổi, tuy nhiên em bé

nhà bạn có thể được tiêm phòng vào bất cứ thời điểm nào cho đến lúc em bé được tròn năm tuổi.

- Nếu em bé nhà bạn đã trên sáu tháng tuổi, em bé sẽ được kiểm tra xét nghiệm xem em bé đã từng tiếp xúc với vi trùng lao hay chưa. Tùy thuộc vào kết quả xét nghiệm, em bé có thể sẽ được tiêm phòng vắc xin BCG.

Tôi phải làm gì nếu muốn đưa em bé nhà mình đi tiêm vắc xin?

Bạn có thể nói chuyện với bà đỡ hoặc bác sĩ để hẹn gặp. Bạn cũng có thể liên hệ với dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại địa phương và xin nói chuyện với y tá chuyên tiêm phòng vắc xin BCG ở khu vực nơi bạn sinh sống.

Hãy tham khảo ở trang sau để biết thêm chi tiết.

Sẽ có những vấn đề gì xảy ra sau khi em bé nhà mình được tiêm vắc xin?

Các phản ứng với vắc xin BCG là bình thường, nhưng những biến chứng nghiêm trọng lâu dài thì rất hiếm. Hầu hết các em bé được tiêm phòng thì ở chỗ vết tiêm đều bị phát triển thành vết thương. Sau khi lành hẳn, vết thương có thể để lại một vết sẹo nhỏ.

- Trong vòng 1 đến 6 tuần đầu, một vết rộp nhỏ màu đỏ có thể xuất hiện ở chỗ vết tiêm.
- Trong vòng 6 đến 12 tuần tiếp theo, vết rộp này có thể chuyển thành một vết thương nhỏ rỉ nước. Nếu chuyện này xảy ra, hãy che vết thương bằng miếng gạc để cho không khí có thể vào được. Không nên dùng miếng dán.
- Vết thương có thể mất đến 3 tháng để lành hẳn và có thể để lại một vết sẹo nhỏ. Chuyện này là bình thường.

Vắc xin này hiệu nghiệm như thế nào?

Mặc dù vắc xin BCG không tránh được việc nhiễm vi trùng lao nhưng vắc xin này giúp cho trẻ không bị mắc bệnh lao ở mức độ nghiêm trọng.

Khả năng phòng tránh của loại vắc xin này kéo dài được bao lâu?

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vắc xin BCG có thể phòng tránh được bệnh lao ở mức độ nghiêm trọng trong vòng 15 năm sau khi tiêm phòng.